

Ce que vous devez savoir ...

## PRENDRE UN ANTIBIOTIQUE INTRAVEINEUX À LA MAISON

Votre médecin vous a prescrit un antibiotique à prendre à la maison. Vous devrez le prendre par une veine dans laquelle un tube a été placé. Voici ce que vous devez faire et surveiller pendant ce traitement.

### Quel est le but de ce traitement?

Le but est d'éliminer les bactéries qui causent l'infection que vous avez.

### Pourquoi devez-vous prendre votre antibiotique par une veine?

Il peut y avoir différentes raisons. Votre médecin vous propose le meilleur traitement selon la gravité de l'infection, le type de bactérie qui la cause et votre état de santé.

Dans certains cas, prendre des antibiotiques en comprimés par la bouche n'est tout simplement pas possible.

Si vous avez des questions à ce sujet, parlez-en avec votre médecin.

### Quelles sont les étapes à suivre ?

#### ÉVALUATION

Votre équipe de soins doit d'abord évaluer si vous pouvez recevoir ce traitement.

Voici les conditions à respecter.

Vous devez habiter un endroit où :

1. la pharmacie peut vous livrer les antibiotiques
2. il y a un frigo en bon état pour les conserver
3. il y a un lavabo et du savon pour vous laver les mains

De plus, vous devez avoir un numéro de téléphone où on peut vous joindre en tout temps. En effet, selon vos résultats d'exams, le traitement doit pouvoir être vite ajusté.

Si l'une de ces conditions change en cours de route, vous devez sans faute avertir votre équipe de soins. C'est important pour votre sécurité.

#### INSTALLATION D'UN CATHÉTER VEINEUX CENTRAL

On vous installe un tube qui entre dans une veine d'un bras. Ce tube vous permettra de vous injecter le traitement. Avant votre départ de l'hôpital, on vous dira comment l'utiliser.

Une fois le cathéter installé, vous devez éviter de faire des mouvements brusques et de soulever des objets lourds.

Il se peut qu'une infirmière de votre CLSC se rende chez vous pour faire des soins d'entretien du cathéter.



## TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

Il est adapté à votre cas. Suivez bien les directives de votre médecin pour prendre l'antibiotique comme il le faut, c'est-à-dire de prendre :

- les doses complètes
- le bon nombre de fois par jour
- pour toute la durée prescrite

## SUIVI

Un rendez-vous de suivi a lieu d'habitude toutes les 1 à 2 semaines pour :

- évaluer si le traitement est efficace
- s'assurer qu'il ne vous cause pas d'effet secondaire important

## RETRAIT DU CATHÉTER

À la fin du traitement, le cathéter sera retiré par l'équipe de soins.

## Comment prendre l'antibiotique ?

Selon l'antibiotique prescrit, vous aurez à utiliser l'un ou l'autre des 3 systèmes suivants. Dans tous les cas, l'antibiotique est liquide.

Chacun de ces systèmes doit être connecté au cathéter.

- Un perfuseur portable (le « biberon »).

L'antibiotique est contenu dans un petit ballon sous pression, au centre d'une bouteille.

Le ballon se vide lentement, au fur et à mesure que l'antibiotique passe dans le cathéter.

- Une pompe programmable.

L'antibiotique est contenu dans un sac relié à la pompe. La pompe reste branchée au cathéter 24 h sur 24. Elle peut être programmée pour donner l'antibiotique à certaines heures seulement ou en continu.



- Une seringue (sans aiguille). Ce système est utilisé plus rarement. La seringue contient une dose d'antibiotique. Il suffit d'appuyer sur le piston pour la faire passer dans le cathéter.

Ces systèmes sont simples à utiliser. La plupart des patients arrivent à prendre leur antibiotique par eux-mêmes.

### Rappel

**Vous devez toujours vous laver les mains avant de manipuler votre cathéter.**



## Pouvez-vous prendre une douche ou un bain durant votre traitement ?

Oui, mais vous devez suivre les précautions suivantes :

- Recouvrez votre cathéter d'une débarbouillette sèche puis mettez par-dessus une pellicule plastique alimentaire (de type Saran Wrap).
- Posez du ruban adhésif conçu pour la peau sur les contours de la pellicule pour la fixer et empêcher l'eau d'y entrer.
- Ne dirigez pas le jet de la douche sur la pellicule de plastique.
- Ne plongez pas votre bras dans l'eau du bain.
- Si vous utilisez un perfuseur ou une pompe, retirez-les avant d'aller dans la douche ou le bain. Important : faites-le entre 2 doses. Ne déconnectez pas votre système pendant qu'une dose est en train d'être injectée ou si vous devez en prendre une autre dans les minutes qui suivent. Vérifiez d'abord avec l'infirmière s'il est sécuritaire pour vous de déconnecter la pompe ou le perfuseur.

**Si vous ne pouvez pas suivre les précautions ci-dessus, il est suggéré de vous laver à la débarbouillette.**

### Le traitement fera-t-il effet rapidement?

De jour en jour, vous devriez vous sentir mieux.

Vos symptômes d'infection (fièvre, douleurs, rougeurs ou autres) devraient disparaître avant la fin du traitement. S'ils reviennent, dites-le sans tarder à votre équipe de soins.

### Quels sont les signes à surveiller?

Il est normal que ce traitement cause de la diarrhée. Ne vous inquiétez pas si vos selles sont plus molles.

Toutefois, appelez sans tarder l'équipe de soins si vous avez l'un des signes suivants :

- plus de 3 selles liquides par jour (signe d'une forte diarrhée)
- des nausées (envies de vomir) ou des vomissements
- des douleurs aux muscles
- des signes d'allergie à l'antibiotique : rougeurs ou boutons sur le corps, qui peuvent ou non donner envie de se gratter, enflure, difficulté à respirer.
- Si vous avez un problème avec votre cathéter :
  - la peau autour du cathéter est très sensible, enflée ou rouge
  - du liquide s'écoule de la peau, là où entre le cathéter
  - vous avez de la difficulté à prendre toute la dose d'antibiotique : le cathéter peut être bloqué et l'équipe de soin doit le vérifier

- Autres signes que votre équipe de soins vous demande de surveiller :

.....

.....

.....

.....

.....



**BESOIN D'INFORMATION?  
QUESTIONS ?**

Communiquez avec votre professionnel de la santé durant les heures d'ouverture.

Nom: \_\_\_\_\_

Tél.: \_\_\_\_\_

Appelez en tout temps Info-Santé ou Info-Social au 8-1-1.