

请接种麻疹疫苗！

保护您的孩子、家人和所爱之人

什么是麻疹？

- 麻疹是一种**传染性极强**的疾病，可能会引发严重后果。麻疹无法治愈。
- 麻疹会在人们交谈、咳嗽或打喷嚏时**迅速传播**。麻疹患者很容易将病毒传染给身边未接种疫苗的人。
- 可能出现**并发症**的人群包括
 - 12 个月（1 岁）以下的儿童；
 - 未接种疫苗的孕妇；
 - 以及免疫系统较弱的人。
- **麻疹症状**包括发烧、出疹、咳嗽、流鼻涕、眼睛发红。
- 麻疹可能引发**肺部和脑部感染**，有时甚至会导致死亡。
- **预防麻疹病毒最好的方法就是接种疫苗。**

麻疹疫苗

- 蒙特利尔居民可**免费接种疫苗**。您无需持有医疗保险卡 (RAMQ)。
- **疫苗效果显著**。接种 2 剂后，防护效力约达 95%。这能降低传播风险。
- **疫苗是安全的**。如需更多信息，请访问 Quebec.ca 上的麻疹、腮腺炎和风疹疫苗 [Measles, mumps and rubella vaccine (MMR)] 页面。

麻疹疫苗不会引发自闭症。

12 个月（1 岁）以下的儿童及孕妇不能接种疫苗。家人和朋友接种疫苗后，儿童和孕妇也能得到保护。

未接种疫苗的哺乳期人群可以接种疫苗。

我对麻疹有免疫力吗？

我出生于1980年或之后

- 我在年满12个月（1岁）后接种了2剂疫苗。

我有免疫力

我出生于1970年至1979年之间

- 我得过麻疹且有相应证明（诊断书或验血报告）
- 或
- 我只接种了1剂疫苗（前提是没有出行过、不在医疗或军事领域工作或实习）
- 或
- 我已经接种了2剂疫苗

我有免疫力

我出生于1970年前

我有免疫力



您或您的孩子在12个月大之前在其他国家/地区接种了第1剂疫苗。

如果在12个月（1岁）之前接种过疫苗，其效果会欠佳。

建议接种第3剂。

我没有接种疫苗，但有人告诉我小时候得过麻疹。

由于多种疾病都会引发皮疹，因此很容易误诊。

建议接种疫苗。

建议

第1步：

- 查看疫苗接种手册，确认您和孩子是否已获得免疫力。
- 或致电1 877 644-4545（魁北克政府）

第2步：

- 如果您或您的孩子需要接种一剂疫苗，请按以下步骤预约：
- 访问 clicsante.ca
- 或拨打 Info-Santé (811) 或 1-877-644-4545



如果您对疫苗接种有任何疑问：

- 咨询专业医务人员
- 联系您的 CLSC
- 如需更多信息，请访问 Quebec.ca 上的麻疹、腮腺炎和风疹疫苗 [Measles, mumps and rubella vaccine (MMR)] 页面。



出现麻疹症状该怎么办

如果您或您的孩子出现麻疹症状，请居家防护并拨打健康咨询热线 (811)。